

ВТОРОЙ СЕМЕСТР. ОБОДОЧНАЯ КИШКА

Выберите наиболее правильный ответ (ответы):

1. Форма клинического течения язвенного колита, характеризующаяся высокой летальностью:

- А. Острая
- В. Хроническая
- С. Молниеносная
- Д. Перемежающаяся

2. Внекишечное проявление язвенного колита:

- А. Гепатит
- В. Узловатая эритема
- С. Миокардит
- Д. Артериальная гипертензия

3. Стул типа «малинового желе» характерен для:

- А. Хронического энтерита
- В. Хронического колита
- С. Язвенного колита
- Д. Болезни Крона

4. Основным клиническим синдромом тяжелой формы язвенного колита:

- А. Мальабсорбции
- В. Диарейный
- С. Диспепсический
- Д. Гепатотоксический

5. Данные ирригоскопии: укорочение, сужение, отсутствие гаустрации, характерны для:

- А. Болезни Крона
- В. Хронического колита
- С. Язвенного колита
- Д. Опухоли кишечника

6. Показания для хирургического лечения язвенного колита:

- А. Перфорация
- В. Эрозия
- С. Острая токсическая дилатация
- Д. Полипоз
- Е. Профузное кровотечение

7. Типичными эндоскопическими критериями болезни Крона являются:

- А. Поверхностные эрозии
- В. Картина «булыжной мостовой»
- С. Чередование поражённых и неизменённых участков слизистой оболочки
- Д. Практически полное отсутствие сосудистого рисунка слизистой оболочки
- Е. Контактная кровоточивость

8. К внекишечным проявлениям болезни Крона относятся:

- А. Гепатит

- В. Иридоциклит
- С. Узловатая эритема
- Д. Хронический парапроктит
- Е. Всё перечисленное

9. Какие из отделов пищеварительного тракта поражаются при болезни Крона?

- А. Толстая кишка
- В. Тонкая кишка
- С. Пищевод
- Д. Желудок
- Е. Все отделы

10. При лёгкой форме язвенного колита в патологический процесс вовлекается:

- А. Слизистая оболочка
- В. Мышечный слой
- С. Серозная оболочка
- Д. Вся стенка кишки

11. Основными клиническими симптомами язвенного колита являются:

- А. Схваткообразные боли в животе
- В. Наличие крови в кале
- С. Частый стул
- Д. Анемия, лихорадка
- Е. Все перечисленные выше симптомы

12. Токсическая дилатация толстой кишки является опасным осложнением при:

- А. Дивертикулёзе толстой кишки
- В. Врождённой долихосигме
- С. Язвенном колите
- Д. Полипозе толстой кишки
- Е. Болезни Крона

13. При болезни Крона патологический процесс чаще локализуется в:

- А. Пищевод
- В. Желудке
- С. Подвздошной кишке
- Д. Прямой кишке

14. Наиболее характерными патоморфологическими аспектами болезни Крона являются:

- А. Гранулемы
- В. Вовлечение в процесс всех слоев кишки
- С. Глубокие язвенные дефекты
- Д. Вовлечение в процесс только слизистой оболочки
- Е. Поверхностные эрозии

15. При язвенном колите легкой степени тяжести медикаментозным средством выбора является:

- А. Фталазол
- В. Левомецетин
- С. Сульфасалазин, месалазин
- Е. Ципрофлоксацин